




Tetanus post-expositieprofylaxe (PEP) bij wonden

- *Open wond met (mogelijk) contact met straatvuil, aarde of mest*
- *Dierenbeet*
- *Diepe 2e- en 3e-graads brandwonden*

Tetanusimmunoglobuline
en tetanusvaccinatie zo
snel mogelijk na de
verwonding toedienen!



Een volledig tetanusvaccinatieschema bestaat uit 1 vaccinatie op drie tijdstippen: 0, 1 en 7 maanden na het incident

Incubatieperiode van tetanus

De incubatietijd van tetanus varieert van 24 uur tot 3 weken. Het is daarom belangrijk om TIG en tetanusvaccinatie zo snel mogelijk na de verwonding toe te dienen. Bij latere presentatie is het nog zinvol om dit tot 21 dagen na de verwonding te doen.

Vaccin

In plaats van een (1e) tetanusvaccinatie volwassenen bij voorkeur DTP geven.

Vaccinatiestatus

Als **volledig gevaccineerd** kunnen worden beschouwd:

- zuigelingen van 4 maanden of ouder die volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn gevaccineerd (ten minste drie tetanusvaccinaties hebben gehad);
- kinderen die alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad die bij hun leeftijd horen;
- volwassenen geboren na 1950 die in hun jeugd anamnestic volledig volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn gevaccineerd óf op volwassen leeftijd drie tetanusvaccinaties volgens schema hebben gehad en dat kunnen aantonen met documentatie;
- mannen geboren na 1936 die in militaire dienst in Nederland zijn geweest.

Als **vermoedelijk volledig gevaccineerd** kunnen worden beschouwd:

- volwassenen die weten dat zij in het verleden volledig gevaccineerd zijn en ten minste drie tetanusvaccinaties hebben gehad (zonder documentatie)

Als **onvolledig gevaccineerd** kunnen worden beschouwd:

- zuigelingen die nog geen drie DKTP-vaccinaties hebben ontvangen;
- kinderen die niet alle DKTP-vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad die bij hun leeftijd horen (zij dienen gemiste vaccinaties alsnog te krijgen. Indien alleen de booster op 4- of 9-jarige leeftijd is gemist, is TIG niet nodig);
- volwassenen die geen volledige serie van 3 DKTP- of tetanusvaccinaties hebben gehad.

Zie verder: www.rivm.nl/richtlijntetanus