




Tetanus post-expositieprofylaxe (PEP) bij wonden

- *Open wond met (mogelijk) contact met straatvuil, aarde of mest*
- *Dierenbeet*
- *Diepe 2e- en 3e-graads brandwonden*

Tetanusimmunoglobuline (TIG)
en tetanusvaccinatie
zo snel mogelijk na de
verwonding toedienen!



*Een volledig tetanusvaccinatieschema bestaat uit vaccinatie op drie tijdstippen: 0, 1 en 7 maanden na het incident.

Incubatieperiode van tetanus:

24 uur tot 3 weken. Het is daarom belangrijk om TIG en tetanusvaccinatie zo snel mogelijk na de verwonding toe te dienen. Bij latere presentatie is het nog zinvol om dit tot 21 dagen na de verwonding te doen.

Volledig gevaccineerd:

- baby's van 4 maanden of ouder die volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn gevaccineerd (dus ten minste drie tetanusvaccinaties hebben gehad);
- kinderen die alle vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad die bij hun leeftijd horen;
- volwassenen geboren na 1950 die in hun jeugd anamnestic volledig volgens het Rijksvaccinatieprogramma zijn gevaccineerd óf op volwassen leeftijd drie tetanusvaccinaties volgens schema hebben gehad en dat kunnen aantonen met documentatie;
- mannen geboren na 1936 die in militaire dienst in Nederland zijn geweest.

Vermoedelijk volledig gevaccineerd:

- volwassenen die weten dat zij in het verleden volledig gevaccineerd zijn / ten minste drie tetanusvaccinaties hebben gehad (zonder documentatie)

Onvolledig gevaccineerd:

- baby's die nog geen drie DKTP-vaccinaties hebben ontvangen;
- kinderen die niet alle DKTP-vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma hebben gehad die bij hun leeftijd horen (zij dienen gemiste vaccinaties alsnog te krijgen. Als alleen de booster op 4- of 9-jarige leeftijd is gemist, is TIG niet nodig);
- volwassenen die geen volledige serie van drie DKTP- of tetanusvaccinaties hebben gehad.

Meer informatie:

Zie de LCI-richtlijn én de nieuwe kennisquiz op rivm.nl/richtlijntetanus. Ook te vinden via richtlijnenapp op lci.rivm.nl/app.