




Mazelen maatregelen bij contacten



Ook bij toediening van postexpositievaccinatie binnen 72 uur bestaat de kans dat deze te laat tot voldoende beschermende antistoffen leidt. In dat geval heeft de vaccinatie geen effect meer op de symptomen, maar is niet schadelijk.

Bij voortdurende blootstelling zoals tijdens een uitbraak kan vaccinatie ook later dan 72 uur na het eerste contact zinvol zijn om tertiaire infecties te voorkomen.

** Humaan immunoglobuline wordt alleen toegediend aan personen met een verhoogd risico op ernstig beloop, bij wie vaccinatie gecontraïndiceerd of niet werkzaam is. Immunoglobuline moet liefst binnen 72 uur maar uiterlijk binnen 7 dagen na het contact worden toegediend.

Overleg bij immuungecompromitteerden altijd met de behandelend arts. Bij een mazelenepidemie in Nederland adviseert het OMT over een eventuele extra BMR-vaccinatie voor zuigelingen tussen 6 en 14 maanden.

Postexpositievaccinatie

- Bij voortdurende blootstelling zoals tijdens een uitbraak/epidemie kan vaccinatie – ook later dan 72 uur na het eerste contact – nog zinvol zijn om tertiaire infecties te voorkomen.
- Indien vaccinatie wordt toegediend vóór de leeftijd van 1 jaar wordt deze vaccinatie als extra beschouwd. Het kind volgt verder het gebruikelijke schema van het RVP en krijgt (opnieuw) een BMR-vaccinatie op de leeftijd van 14 maanden. Vaccinaties toegediend na de eerste verjaardag kunnen vaccinaties in het kader van het RVP vervangen.

Postexpositieprofylaxe met humaan immunoglobuline

- Humaan immunoglobuline wordt alleen toegediend aan personen met een verhoogd risico op ernstig beloop, bij wie vaccinatie gecontraïndiceerd of niet werkzaam is. Immunoglobuline moet liefst binnen 72 uur maar uiterlijk binnen 7 dagen na het contact worden toegediend.
- Voor zuigelingen van niet-immune moeders is de dosering 0,6 ml per kg, met een maximum van 5 ml, intramusculair toe te dienen.
Voor niet-immune zwangeren is de dosering 15 ml, intramusculair toe te dienen.
Overleg bij immuungecompromitteerden altijd met de behandelend arts.



Bij een mazelenepidemie in Nederland adviseert het OMT over een eventuele extra BMR-vaccinatie voor zuigelingen tussen 6 en 14 maanden.