















Stollingsstoornissen bij mensen van 18 jaar en ouder.

Stollingsstoornis	Contact behandelaar/ interval medicatie en vaccinatie	Beleid t.a.v. intramusculair vaccineren
Aangeboren stollingsstoornis: hemofilie, Z van Von Willebrand (stollingsfactoractiviteit <10%)	Specialist is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Specialist is NIET akkoord met i.m. vaccinatie maar onder voorwaarden wel met s.c. vaccinatie	 s.c. vaccinatie met een mRNA-vaccin, 10 minuten stevig afdrukken
	Niet meer in behandeling bij specialist	Beoordeling door arts op vaccinatielocatie (op basis van ervaringen met vaccinaties bij patiënt)
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: cumarinederivaten (Vit.K- antagonisten of VKA) ^a	Trombosedienst is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Trombosedienst is NIET geraadpleegd, maar INR stabiel ^b	 En minimaal 2 minuten stevig afdrukken
	Trombosedienst is NIET geraadpleegd, INR wisselend ^c , maar 7 dagen vooraf vaccinatie INR <3,5	 En minimaal 2 minuten stevig afdrukken
	Trombosedienst is NIET geraadpleegd, INR wisselend ^c , en 7 dagen vooraf vaccinatie INR ≥3,5	 Geen vaccinatie; patiënt contact laten opnemen met trombosedienst.
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: laag- moleculairgewichtsheparine (LMWH) ^d , in eenmaal daagse dosering of tweemaal daagse dosering	Interval tussen medicatie en vaccinatie is ≥6 uur	 En minimaal 2 minuten stevig afdrukken
	Interval tussen medicatie en vaccinatie is <6 uur	 En minimaal 10 minuten stevig afdrukken
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: trombocytenaggregatieremmers (TAR) ^e	N.v.t.	 En minimaal 2 minuten stevig afdrukken
Trombopathie of trombopenie (aantal trombocyten <50 x 10 ⁹ /l)	Specialist (of behandelend arts) is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Specialist(of behandelend arts) is NIET akkoord met i.m. toediening maar onder voorwaarden wel met s.c. toediening.	 s.c. vaccinatie met een mRNA-vaccin, 10 minuten stevig afdrukken.
	Niet meer in behandeling bij specialist	Beoordeling door arts op vaccinatielocatie(op basis van ervaringen met vaccinaties bij patiënt)
Direct werkende antistollings- medicatie (DOAC) ^f	N.v.t.	 En minimaal 2 minuten stevig afdrukken
Combinaties van antistollingsmiddelen: TAR + DOAC :	Interval tussen DOAC en vaccinatie is ≥6 uur	 En minimaal 2 minuten stevig afdrukken
	Interval tussen DOAC en vaccinatie is <6 uur	 En minimaal 10 minuten stevig afdrukken
Combinaties van antistollings- middelen: TAR + VKA	Volg advies voor VKA	Volgens advies voor VKA

^a VKA voorbeelden: acenocoumarol en fenprocoumon (Marcoumar).

^b INR stabiel: de afgelopen 3 maanden hoefde het medicatiebeleid niet aangepast te worden op basis van de INR-controles.

^c INR wisselend: er wordt regelmatig gecontroleerd door de trombosedienst.

^d LMWH voorbeelden: nadroparine (Fraxiparine, Fraxiparine Forte), dalteparine (Fragmin), tinzaparine (Innohep) en enoxaparine (Clexane, Inhixa, Lovenox). Deze worden onder andere voorgeschreven aan patiënten met veneuze trombose of longembolie bij kanker of aan zwangere vrouwen die antistolling nodig hebben.

^e TAR voorbeelden: acetylsalicylzuur (Aspro, Aspirine, Alka-Seltzer), clopidogrel (Grepid, Iscover, Plavix), dipyridamol (Persantin), prasugrel en ticagrelor.

^f DOAC voorbeelden: rivaroxaban of edoxaban (eenmaal daags gedoseerd) en apixaban of dabigatran (tweemaal daags gedoseerd).