



Informatie gebruik oseltamivir

Bijsluiters in andere talen zijn te vinden op de site van [website van de EMA](#)
EMA (European Medicines Agency); zoeken op 'oseltamivir'.

U krijgt medicijnen omdat u contact heeft met besmette kippen of eenden.
Deze medicijnen kunnen voorkomen dat u zelf vogelgriep krijgt.

Dosering:

1 x per dag 1 capsule van 75 mg.

Hoe neemt u dit middel in?

U neemt dit middel elke dag in op hetzelfde tijdstip. Slik de capsules heel
door met wat water. U moet zo snel mogelijk beginnen met het nemen van
dit middel. Lees de bijsluiter voordat u dit middel gaat gebruiken.

Duur van medicijngebruik:

- als u meegeholpen hebt met de ruiming: tot 10 dagen nadat u stopt met
uw werkzaamheden met mogelijk besmet pluimvee.
- als u pluimveehouder/bewoner bent: tot 10 dagen na de ruiming c.q. de
laatste blootstelling.

Bijzonderheden:

Heeft u nierfunctiestoornissen, bent u zwanger (of zou u dit kunnen zijn) of
geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw GGD-arts of
behandelend arts voordat u dit medicijn gebruikt.

Bijwerkingen:

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben.

U kunt last hebben van misselijkheid, braken, maagpijn en hoofdpijn.

Meestal wordt dit minder na 1-2 dagen.

Bel de GGD als u last heeft van bijwerkingen [**telefoonnummer**]

Bel ook als u de medicijnen niet meer in wilt nemen. Overleg altijd met een
arts voordat u stopt met de medicijnen.

Bijwerkingen kunt u ook melden bij het Nederlands bijwerkingencentrum
Lareb via www.lareb.nl.