

Instructie klaarmaken toedieningsspuit en -naald Bimervax XFG.1.1

Vaccin: Bimervax XFG.1.1 (HIPRA) 40 mcg; kant-en-klaar

Leeftijd: 12 jaar en ouder

Dosering: 0,5 ml

Doses per flacon: 1


Spuit-naaldcombinaties:



Spuit	Naald
Sol-M	Veiligenaaldsysteem BD Eclipse 23G
Klinion	Veiligenaaldsysteem Klinion 25G

Zie bijlage 2 van de uitvoeringsrichtlijn voor close-up foto's van de spuiten en naalden.

1		Handen wassen • Voor het landelijk kader voor COVID-19-vaccinaties, zie de uitvoeringsrichtlijn op https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19-vaccinatie • Handhygiëne: zie paragraaf 7.1 van de uitvoeringsrichtlijn en https://www.rivm.nl/documenten/instructies-handenwassen
2		Zet de benodigdheden binnen handbereik • Vaccinflacon • Optreknaald 18G • Toedieningsspuit 1 ml • Veilige naaldsysteem • Naaldencontainer • Container voor medisch afval, bijvoorbeeld een Wiva-vat (blauwe bak met gele deksel) • Pen NB 1. Zie hoofdstuk 6 van de uitvoeringsrichtlijn voor informatie over temperatuur, houdbaarheid en expiratiedatum. NB 3. Spuiten en naalden pas vlak voor gebruik uit de verpakking halen om contaminatie van de tip van de spuit waarop de injectienaald wordt bevestigd en de naaldaansluiting (naaldconus) te voorkomen.
3		Inspectie inhoud vaccinflacon • Expiratiedatum • Glasbreuk • Kleur: witte homogene emulsie • De kleur van het flip-off kapje is blauw en de dosering is 40 microgram/dosering.

4		Vaccinflacon 10 x zwenken • Let op: zwenken/omkeren, niet schudden!
5		Flip-off-kapje vaccinflacon verwijderen • Flip-off-kapje verwijderen zonder de rubberen dop aan te raken. Het vaccin is in een steriele omgeving geproduceerd. De rubberen dop hoeft daardoor niet gedesinfecteerd te worden.
6		Klaarmaken eerste toedieningsspuit • Toedieningsspuit (1 ml) en optreknaald (18G) uit de verpakking halen en koppelen. • Vaccinflacon aanprikken met optreknaald. NB. Raak hierbij rubberen dop, tip van de spuit (conus) en naald niet aan. De naaldconus, in dit geval rood, aan de zijkant vasthouden als de optreknaald wordt vast- of losgekoppeld. Let op dat de bovenkant van de naaldconus met het lumen niet aangeraakt wordt.
7		Vaccin optrekken • Draai de vaccinflacon voorzichtig omhoog (1). Dit zorgt ervoor dat de aanwezige lucht in de vaccinflacon zich naar boven kan verplaatsen. • Trek via de optreknaald een kleine hoeveelheid vaccin op in de toedieningsspuit (2). Er zal een luchtbel zichtbaar zijn. • Druk de zuiger vervolgens voorzichtig terug naar de beginpositie van de toedieningsspuit (3). • Herhaal de bewegingen (2) en (3) totdat er geen lucht meer zichtbaar is en trek vervolgens vaccin op tot het streepje bij 0,5 ml in de toedieningsspuit.

8		Veiligenaaldsysteem op toedieningsspuit zetten • Toedieningsspuit losdraaien van de optreknaald. • Plaats veiligenaaldsysteem op de toedieningsspuit. • Draai deze goed aan, u kunt hierbij enige weerstand voelen. • De toedieningsspuit is nu klaar voor gebruik. • Het vaccin moet zo snel mogelijk worden toegediend. • Als de toedieningsspuit is gevuld, wordt de vacinflacon met optreknaald als medisch afval weggegooid (conform UN3291), bijvoorbeeld in een Wiva-vat. Zie ook paragraaf 8.7 van de uitvoeringsrichtlijn.
---	--	---