
















Tabel 1. Stollingsstoornissen voor mensen van 18 jaar en ouder

Stollingsstoornis	Contact behandelaar/ interval medicatie en vaccinatie	Vaccinatie i.m. en 2 minuten stevig afdrukken, tenzij andere instructies
Aangeboren stollingsstoornis: hemofilie, Z van Von Willebrand	Specialist is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Specialist is niet akkoord	 Geen vaccinatie
	Niet meer in behandeling bij specialist	Beoordeling door arts op vaccinatielocatie (op basis van ervaringen met vaccinaties bij patiënt)
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: cumarinederivaten (Vit.K- antagonisten of VKA) ^a	Trombosedienst is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Trombosedienst is NIET geraadpleegd, maar INR stabiel ^b	
	Trombosedienst is NIET geraadpleegd, INR wisselend ^c , maar 7 dagen vooraf vaccinatie INR <3,5	
	Trombosedienst is NIET geraadpleegd, INR wisselend ^c , en 7 dagen vooraf vaccinatie INR ≥3,5	 Geen vaccinatie, maar trombosedienst raadplegen
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: laag- moleculairgewichtsheparine (LMWH) ^d , in eenmaal daagse dosering of tweemaal daagse dosering	Interval tussen medicatie en vaccinatie is ≥6 uur	
	Interval tussen medicatie en vaccinatie is <6 uur	 En minimaal 10 minuten stevig afdrukken
Verworven stoornis door antistollingsmedicatie: trombocytenaggregatieremmers (TAR) ^e	N.v.t.	
Trombopathie of trombopenie (aantal <50x 10 ⁹ /l)	Specialist (of behandelend arts) is akkoord	 Evt. met extra instructies
	Specialist(of behandelend arts) is niet akkoord	 Geen vaccinatie
	Niet meer in behandeling bij specialist	Beoordeling door arts op vaccinatielocatie(op basis van ervaringen met vaccinaties bij patiënt)
Direct werkende antistollings- medicatie (DOAC) ^f	Interval tussen medicatie en vaccinatie is ≥6 uur	
	Interval tussen medicatie en vaccinatie is <6 uur	 En minimaal 10 minuten stevig afdrukken
Combinaties van antistollingsmiddelen: TAR + DOAC:	Interval tussen DOAC en vaccinatie is ≥6 uur	
	Interval tussen DOAC en vaccinatie is <6 uur	 en minimaal 10 minuten stevig afdrukken
Combinaties van antistollings- middelen: TAR + VKA	Volg advies voor VKA	Volgens advies voor VKA

^a VKA voorbeelden: acenocoumarol en fenprocoumon (Marcoumar).

^b INR stabiel: de afgelopen 3 maanden hoefde het medicatiebeleid niet aangepast te worden op basis van de INR-controles.

^c INR wisselend: er wordt regelmatig gecontroleerd door de trombosedienst.

^d LMWH voorbeelden: nadroparine (Fraxiparine, Fraxiparine Forte), dalteparine (Fragmin), tinzaparine (Innohep) en enoxaparine (Clexane, Inhixa, Lovenox). Deze worden onder andere voorgeschreven aan patiënten met veneuze trombose of longembolie bij kanker of aan zwangere vrouwen die antistolling nodig hebben.

^e TAR voorbeelden: acetylsalicylzuur (Aspro, Aspirine, Alka-Seltzer), clopidogrel (Grepid, Iscover, Plavix), dipyridamol (Persantin), prasugrel en ticagrelor.

^f DOAC voorbeelden: rivaroxaban of edoxaban(eenmaal daags gedoseerd) en apixaban of dabigatran (tweemaal daags gedoseerd).