



Immuungecompromitteerde patiënten

Doorverwijspagina

Afweerstoornissen

Afweerstoornissen komen vaak voor in Nederland. Het gaat meestal om verworven afweerstoornissen die onder andere bij gebruik van immuunsuppressiva kunnen optreden. Patiënten krijgen immuunsuppressieve medicatie voor de behandeling van chronisch inflammatoire aandoeningen, zoals reumatoïde artritis, Systemische Lupus Erythematoses (SLE), de ziekte van Crohn en colitis ulcerosa (inflammatory bowel disease, IBD) of psoriasis.

Minder frequent zijn aangeboren immuundeficiënties en afweerstoornissen die ontstaan door medicatie na transplantatie van organen of na stamceltransplantatie, tijdens chemotherapie, door hematologische aandoeningen of door hiv-infectie.

Waar vind ik informatie?

Deze patiënten kunnen een hoger risico hebben op het oplopen van bepaalde infecties en een gecompliceerder beloop van infecties. In **alle LCI-richtlijnen** is er speciale aandacht voor deze groepen onder 'Risicogroepen' (onder 'Verhoogde kans op infectie' en 'Verhoogde kans op ernstig beloop'), 'Preventie' en 'Maatregelen'.

In de factsheets over de verschillende vaccinaties worden medische risicogroepen besproken onder 'Indicaties' en 'Contra-indicaties'. U vindt de lijst factsheets onder 'Zie ook'.

Daarnaast zijn er specifieke aanbevelingen:

- [Handleiding Vaccinatie-aanbevelingen voor patiënten met chronische inflammatoire aandoeningen](#)
- [Richtlijn Preventie van infecties bij mensen met \(functionele\) hypo- en asplenie](#)

Vaccinaties bij andere afweerstoornissen zullen in afzonderlijke handleidingen worden beschreven door het LCI-RIVM. Op dit moment wordt verder gewerkt aan Handleidingen voor vaccinatie bij hematologische aandoeningen.